



Dr n. med. Jarosław Pniewski
Oddział Neurologiczny,
Szpital Czerniakowski,
Warszawa

Neurologia po Dyplomie
2012; 7 (4): 11

W tym numerze mogą się Państwo zapoznać z pracą autorów australijskich, którzy przeprowadzili metaanalizę dotyczącą zależności między szansą na odzyskanie zdolności do samodzielnego chodzenia u pacjentów z udarem mózgu a miejscem ich leczenia (oddział rehabilitacyjny czy oddział, w którym leczeni są pacjenci w ostrym okresie udaru). Należy zgodzić się z autorami, że samo kryterium uzyskania zdolności do samodzielnego chodzenia jest niezwykle istotne z punktu widzenia chorego. To jedno kryterium warunkuje bardzo wiele, niekiedy może nawet więcej niż inne stosowane skale (nierzadko bardzo dokładne i szczegółowe). Od tego, czy człowiek może samodzielnie chodzić rzeczywiście bardzo wiele zależy, zarówno miejsce, do którego kierowani są chorzy po zakończeniu hospitalizacji w oddziale neurologicznym lub rehabilitacyjnym (instytucja opiekuńcza czy własny dom), jak i możliwość prowadzenia względnie samodzielnego i tzw. normalnego życia. Należy więc zgodzić się, że warto za pomocą tego jednego prostego kryterium ocenić szansę na poprawę stanu chorego w zależności od miejsca leczenia. Proponuję przeczytać poniższy artykuł, aby uzyskać odpowiedź na postawione na wstępie pytanie.